245mm

127mm

Dow AgroSciences

MATRIGON*

Volg de bijgevoegde gebruiksaanwijzing om gevaar aan mens en dier te voorkomen /
Respecter les instructions d'utilisation, ci-jointes, pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement

PRECAUTIONS D'EMPLOI

S2 Conserver hors de portée des enfants.
S13 Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
S20/21 Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

CENTRE ANTIPOISONS : 070/245.245.

GARANTIE

Le fabricant n'est pas responsable des risques de stockage, de l'utilisation et de la manipulation du MATRIGON* puisqu'il n'a aucun contrôle sur ceux-ci. Le fabricant garantit exclusivement la composition et le contrôle de qualité du produit qui est légalement autorisé à la vente et qui correspond à la formule mentionnée sur l'étiquette.

HERBICIDE

HERBICIDE SELECTIF ANTIDICOTYLEES
EN CÉRÉALES D'HIVER & DE PRINTEMPS : FROMENT, ESCOURGEON, ORGE, AVOINE, TRITICALE, SEIGLE & ÉPEAUTRE
EN BETTERAVES, LIN, MAÏS, FRAISIER
EN COLZA & EN CHOUX : POMMÉS, CAVALIERS, DE BRUXELLES

SELECTIEF HERBICIDE TEGEN BREEDBLADIGEN
WINTER- EN ZOMERGRANEN : TARWE, GERST, ROGGE, HAVER, SPELT, TRITICALE
BIETEN, VLAS, MAIS, AARDBEIEN,
KOOLZAAD & KOOLGEWASSEN : KRUL-, BOERE-, SLUIT-, KABUIS-, SPRUITKOOL

1 L ℮ PET

Dow AgroSciences B.V.
Prins Boudewijnlaan 41
B2650 Edegem, België
Tel : 03 450 27 00
Fax : 03 457 07 73

Contient : SL - concentré soluble à base de clopyralid 100 g/L (= 9,5%)
Bevat : SL - met water mengbaar concentraat op basis van clopyralid 100 g/L (= 9,5%)
Numéro d'agréation/Erkenningsnummer : 8200 / B
Numéro d'agrément : L 915-66
MATRIGON* trademark of Dow AgroSciences LLC
N° de lot : voir sur le flacon
Partijnummer : zie op de bus

VOORZORGSMAATREGELEN

S2 Buiten bereik van kinderen bewaren.
S13 Verwijderd houden va eet-en drinkwaren en van diervoeder.
S20/21 Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

ANTIGIFCENTRUM : 070/245.245.

WAARBORG

De fabrikant is niet aansprakelijk voor de risico's die voortvloeien uit het opslaan, gebruik en verwerken van MATRIGON* aangezien deze buiten zijn controle liggen. De fabrikant garandeert uitsluitend de samenstelling en de kwaliteit van het product dat wettelijk is toegelaten en overeenstemt met de formulering vermeld op het etiket.

P0001817610

245mm

127mm

LEDIGE VERPAKKING EN SPUITOVERSCHOTTEN

De ledige verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden door middel van een manueel systeem (3 opeenvolgende malen schudden met water) of door middel van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sproeitoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de sproeitank gegoten worden. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.
Spuitoverschotten minstens 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandelde perceel volgens de gebruiksvoorschriften. Vijvers, waterlopen, beken en grachten noch met het middel, noch met de verpakking vervuilen. De verpakking in geen geval herbruiken voor een ander doel. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

WERKINGSSPECTRUM

Zeer gevoelig
Komposieten (Asteraceae)
akkerkool
akkerdistel
driedelig tandzaad
cichorei-opslag
gele ganzenbloem
kamille
canadese fijnstraal
klein hoefblad
klein klopkruid
korenbloem
kruiskruid
melkdistel
valse kamille
Vlinderbloemigen
aardaker
klaver
wikke
Stadia van de onkruiden
Distels (melk- & akker-) : 20 tot 30 cm hoogte.

HOE GEBRUIKEN
1 - ERKENDE TEELTEN

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. De dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma's met lage dosissen (zoals het FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.
Winter- en zomergranen : tarwe, gerst, rogge, haver, spelt, triticale
Bieten
Vlas
Mais
Aardbei
Koolgewassen : sluit-, kabuis-, boere-, krul-, spruitkool
Koolzaad

2- DOSIS EN TOEPASSINGSTIJDSTIP
2-1- GRANEN

In winter- en zomergranen
Stadium van de granen : einde uitstoeling tot het eerste knoopstadium.
Tegen asteraceae onkruiden & distels.
Stadium van de distels : 20 à 30 cm hoogte voor de vorming van de bloeiwijze.
Dosis : MATRIGON 0,7 à 0,9 L/ha.

2-2- BIETEN

Ter bestrijding van akker- en melkdistel
Stadium : 10 à 30 cm van de distels altijd voordat de bloemknop gevormd is.
Stadium van de bieten : 8 à 10 bladeren.
Dosis : MATRIGON 1,2 à 1,8 L/ha + olie in geval van zware overwoekering.
F A R M programma ter bestrijding van hondspeterselie
Dosis
MATRIGON 1 à 1,5 L/ha toegediend in fracties van 0,5 L/ha gemengd met fenmedifam en een wortelherbicide (FAR systeem).
De behandeling kan plaatsvinden vanaf het stadium 2 echte bladeren van de biet en zal herhaald worden in functie van het stadium van de bieten of de onkruiden onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij toepassing volgens een dergelijk systeem, kan een nevenwerking tegen aardappelopslag bekomen worden.

2-3- VLAS

Stadium : 12 à 18 cm hoogte van het vlas. Niet spuiten na het verschijnen van de bloemknop.
Tegen asteraceae onkruiden & distels.
Stadium van de distels : 20 à 30 cm hoogte voor de vorming van de bloeiwijze.
Dosering : MATRIGON 1,5 L/ha zonder olie.

2-4- MAIS

Stadium : 6 à 10 bladstadium van de maïs.
Tegen asteraceae onkruiden & distels.
Stadium van de distels : 20 à 30 cm hoogte voor de vorming van de bloeiwijze.
Dosering : MATRIGON 1,5 L/ha.

2-5- AARDBEI

Najaar op gezonde planten MATRIGON 1,5 L/ha
Rustperiode van de aarbeien (december tot februari) :
Tegen asteraceae onkruiden & distels.
Stadium van de distels : 20 à 30 cm hoogte voor de vorming van de bloeiwijze.
MATRIGON 1,5 L/ha.

2-6- KOOLGEWASSEN

Periode : vanaf het 2 bladstadium of 3 à 4 weken na poten.
Tegen asteraceae onkruiden & distels.
Stadium van de distels : 20 à 30 cm hoogte voor de vorming van de bloeiwijze.
Dosis
MATRIGON 1 L/ha of 10 mL/are.
In spruitkool
MATRIGON 1 à 1,2 L/ha of 10 à 12,5 mL/are.

2-7- KOOLZAAD

Stadium : vanaf het 2-4 bladstadium in de herfst of na het hernemen van de groei in de lente.
Dosis : MATRIGON 1 tot 1,5 L/ha.
BELANGRIJKE OPMERKING : indien MATRIGON alleen gespoten wordt, altijd olie toevoegen behalve op vlas.

3- WEERSOMSTANDIGHEDEN

25°C : maximum temperatuur om te spuiten.

MATRIGON best spuiten bij hoge luchtvochtigheid

10°c : minimum temperatuur om te spuiten
Temperatuur dient te worden gemeten in de schaduw net vóór de bespuiting.
Niet spuiten bij noorden- of oostenwind. Bij warm weer, 's avonds spuiten.



4- EERSTEHULPMAATREGELEN

Geen drinken geven of braken opwekken als het slachtoffer bewusteloos is.
Inslikken
Geen braken opwekken. Waarschuw een arts. De beslissing om al dan niet braken op te wekken, moet door een arts genomen worden.
Contact met de ogen
De ogen spoelen met veel water.
Huidcontact
Grondig wassen met water en zeep.
Inademen
Naar de frisse lucht vervoeren. Raadpleeg een arts.

5- AANWIJZING VOOR DE ARTS

Geen specifiek antidotum. Ondersteunende behandeling. Behandeling volgens het oordeel van de arts, rekening houdend met de symptomen bij de patient.

245mm

127mm

EMBALLAGE VIDE ET SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage vide de ce produit doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (3 agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur au point de ramassage prévu à cet effet.
Diluer les surplus de traitement au moins 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fosses avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer ou la quantité à appliquer en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

SPECTRE D'ACTIVITE

Très sensibles
Composées (Asteraceae)
anthémis
bident tripartite
bleuet
chardon
chrysanthème des moissons
érigéron du Canada
galinsoge
laiteron
lampsane
matricaire camomille
repousse de chicorée
séneçon
tussilage pas d'âne
Légumineuses
gesse tubéreuse
trèfle
vesce
Stades spéciaux
Chardon ou laiteron : 20 à 30 cm de hauteur

MODE D'EMPLOI
1-CULTURES AGREEES

La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, par exemple dans les programmes de désherbage par mini-doses (comme le système FAR en betteraves). La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'application, ni la réduction du délai avant récolte.
En céréales d'hiver & de printemps : froment, escourgeon, orge, avoine, triticale, seigle & épeautre
En betteraves
En lin
En maïs
En fraisier
En choux : pommés, cavaliers, de Bruxelles
En colza

2- DOSES ET STADES D'APPLICATION
2-1- CEREALES

Céréales d'hiver et de printemps
Stade de la céréale : fin tallage jusqu'au premier nœud.
Pour lutter contre les dicots asteraceae & les chardons.
Stade des chardons : 20 à 30 cm de hauteur avant le début floraison.
Dose : MATRIGON 0,7 à 0,9 L/ha.

2-2- BETTERAVES

Pour lutter contre chardon, laiteron
Stade : 10 à 30 cm du chardon avant la formation du bouton floral.
Stade de la betterave : 8 à 10 feuilles.
Dose : MATRIGON 1,2 à 1,8 L/ha en cas d'infestation forte.
Programme F A R M pour lutter contre l'aethusa
Dose
MATRIGON 1 à 1,5 L/ha en 2 ou 3 fractions de 0,5 L/ha chacune en mélange avec le FAR à partir du stade 2 feuilles de la betterave. La répétition du traitement se décide en fonction du stade de la betterave & de la réapparition de l'aethusa.
Ce traitement est sous la responsabilité de l'utilisateur.
Le systéme FARM peut avoir une action secondaire intéressante sur les repousses de pomme de terre.

2-3- LIN

Stade : 10 à 18 cm de hauteur du lin. Ne pas traiter après l'apparition des boutons floraux.
Pour lutter contre les dicots composées & les chardons.
Stade des chardons : 20 à 30 cm de hauteur avant le début floraison.
Dose : MATRIGON 1,5 L/ha sans huile.

2-4- MAIS

Stade : 6 à 10 feuilles du maïs.
Pour lutter contre les dicots composées & les chardons.
Stade des chardons : 20 à 30 cm de hauteur avant le début floraison.
Dose : MATRIGON 1,5 L/ha.

2-5- FRAISIER

En automne sur des plants sains : MATRIGON 1,5 L/ha.
Pendant la période de repos des fraisiers (décembre à février) :
Pour lutter contre les dicots composées & les chardons.
Stade des chardons : 20 à 30 cm de hauteur avant le début floraison.
MATRIGON 1.5 L/ha.

2-6- CHOUX

Epoque : à partir de 2 feuilles ou 3 à 4 semaines après la plantation.
Pour lutter contre les dicots composées & les chardons.
Stade des chardons : 20 à 30 cm de hauteur avant le début floraison.
Dose
MATRIGON 1 L/ha ou 10 mL/are.
En chou de Bruxelles
MATRIGON 1 à 1,2 L/ha ou 10 à 12,5 ml/are.

2-7 COLZA

Stade : à partir du stade 2 - 4 feuilles du colza ou au printemps après la reprise.
Dose : MATRIGON 1 à 1,5 L/ha.
CONSEIL GENERAL : lorsque MATRIGON est utilisé seul, il faut ajouter une huile minérale, sauf en lin.

3- CONDITIONS CLIMATIQUES

25°C : température maximum d'utilisation.

pulvériser MATRIGON par hygrométrie élevée

10°c : température minimum d'utilisation.
La prise de T° se fait à l'ombre juste avant de pulvériser.
Par temps chaud, traiter le soir. Ne pas traiter par vent du Nord ou d' Est.



4- PREMIERS SECOURS

Ne jamais faire boire ou faire vomir si le patient est inconscient ou a des convulsions.
Ingestion
Ne pas faire vomir. Appeler un médecin. La décision de faire vomir ou non doit être prise par un médecin.
Contact avec les yeux
Laver les yeux à grande eau.
Contact avec la peau
Laver minutieusement au savon et à l'eau.
Inhalation
Emmener à l'air frais. Consulter un médecin

5- NOTE AU MEDECIN

Pas d'antidote spécifique. Traitement de soutien au choix du médecin en fonction des réactions du patient.

231mm

Corner of b
(shown red)
to assist wit
open

Dow AgroSciences

MATRIGON*

Volg de bijgevoegde gebruiksaanwijzing om gevaar aan mens en dier te voorkomen /
Respecter les instructions d'utilisation, ci-jointes, pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement

PRECAUTIONS D'EMPLOI

S2 Conserver hors de portée des enfants.
S13 Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
S20/21 Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

CENTRE ANTIPOISONS : 070/245.245.

GARANTIE

Le fabricant n'est pas responsable des risques de stockage, de l'utilisation et de la manipulation du MATRIGON* puisqu'il n'a aucun contrôle sur ceux-ci. Le fabricant garantit exclusivement la composition et le contrôle de qualité du produit qui est légalement autorisé à la vente et qui correspond à la formule mentionnée sur l'étiquette.

HERBICIDE

HERBICIDE SELECTIF ANTIDICOTYLEES
EN CÉRÉALES D'HIVER & DE PRINTEMPS : FROMENT, ESCOURGEON, ORGE, AVOINE, TRITICALE, SEIGLE & ÉPEAUTRE
EN BETTERAVES, LIN, MAÏS, FRAISIER
EN COLZA & EN CHOUX : POMMÉS, CAVALIERS, DE BRUXELLES

SELECTIEF HERBICIDE TEGEN BREEDBLADIGEN
WINTER- EN ZOMERGRANEN : TARWE, GERST, ROGGE, HAVER, SPELT, TRITICALE
BIETEN, VLAS, MAIS, AARDBEIEN,
KOOLZAAD & KOOLGEWASSEN : KRUL-, BOERE-, SLUIT-, KABUIS-, SPRUITKOOL

1 L ℮ PET

Dow AgroSciences B.V.
Prins Boudewijnlaan 41
B2650 Edegem, België
Tel : 03 450 27 00
Fax : 03 457 07 73

Contient : SL - concentré soluble à base de clopyralid 100 g/L (= 9,5%)
Bevat : SL - met water mengbaar concentraat op basis van clopyralid 100 g/L (= 9,5%)
Numéro d'agréation/Erkenningsnummer : 8200 / B
Numéro d'agrément : L 915-66
MATRIGON* trademark of Dow AgroSciences LLC
N° de lot : voir sur le flacon
Partijnummer : zie op de bus

VOORZORGSMAATREGELEN

S2 Buiten bereik van kinderen bewaren.
S13 Verwijderd houden va eet-en drinkwaren en van diervoeder.
S20/21 Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

ANTIGIFCENTRUM : 070/245.245.

WAARBORG

De fabrikant is niet aansprakelijk voor de risico's die voortvloeien uit het opslaan, gebruik en verwerken van MATRIGON* aangezien deze buiten zijn controle liggen. De fabrikant garandeert uitsluitend de samenstelling en de kwaliteit van het product dat wettelijk is toegelaten en overeenstemt met de formulering vermeld op het etiket.